

Fiche de Suivi : Traitement Inexium pour Nourrisson

Instructions importantes

- Respectez scrupuleusement la dose prescrite par votre pédiatre.
- Administrez le traitement à heure fixe, idéalement 30 minutes avant le repas.
- Ne jamais écraser ou mâcher les microgranules contenus dans le sachet.
- Mélangez le contenu du sachet avec une petite quantité d'eau ou de compote non acide.
- Administrez immédiatement après la préparation, ne pas conserver le mélange.

Tableau de suivi quotidien

- Date et heure de l'administration.
- Dose administrée (en mg ou nombre de sachets).
- Symptômes observés avant la prise (reflux, pleurs, agitation).
- Qualité de la prise alimentaire (refus, quantité bue).
- Effets secondaires éventuels (diarrhées, constipation, éruptions cutanées).

Observations pour le pédiatre

- Fréquence et intensité des régurgitations sur la journée.
- Qualité du sommeil (durée des siestes, réveils nocturnes).
- Évolution du comportement (bébé plus apaisé ou toujours irritable).
- Prise de poids et appétit général.
- Tout changement inhabituel dans l'état de santé de l'enfant.

Conseils pratiques

- Gardez cette fiche à portée de main pour chaque consultation.
- Notez les heures de repas pour corréler les symptômes avec le traitement.
- En cas de doute sur une dose oubliée, contactez votre pharmacien ou pédiatre.
- Conservez les sachets dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants.