

Guide de suivi et calendrier de traitement : Pyrale du Buis

Calendrier de surveillance annuelle

- Mars-Avril : Installation des pièges à phéromones pour détecter le début du vol des papillons.
- Mai-Juin : Surveillance accrue pour la première génération de chenilles.
- Juillet-Août : Période critique, pic d'activité de la deuxième génération.
- Septembre-Octobre : Troisième génération avant l'hivernage des chenilles.

Signes d'alerte à surveiller

- Présence de fils de soie caractéristiques entre les feuilles.
- Feuilles grignotées, jaunies ou squelettées.
- Déjections vertes (petites billes) au pied du buis.
- Dessèchement rapide de branches entières ou du centre du buisson.

Stratégies de traitement recommandées

- Mécanique : Ramassage manuel des chenilles si l'infestation est localisée.
- Biologique : Application de *Bacillus thuringiensis* (Bt) dès l'apparition des premières larves.
- Préventif : Installation de nichoirs à mésanges, prédateurs naturels de la pyrale.
- Fréquence : Renouveler le traitement tous les 10 à 15 jours en cas de forte pression.

Checklist de suivi mensuel

- Vérifier l'état des pièges à phéromones et vider les captures.
- Inspecter l'intérieur du feuillage (base et centre du buis).
- Noter la date de la première observation de chenilles dans votre carnet de jardin.
- Appliquer le traitement biologique si le seuil d'alerte est atteint.
- Nettoyer les débris végétaux sous les buis pour limiter les refuges.